

KỸ THUẬT TRỒNG CHÔM CHÔM

NỘI DUNG

I. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA QUẢ CHÔM CHÔM:

- Là loại cây ăn quả nhiệt đới có chứa đường, các Vitamin và khoáng chất.
- Quả ăn tươi, chế biến thành xiro hoặc đóng hộp.

II. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ YÊU CẦU NGOẠI CẢNH

1. Đặc điểm thực vật:

- Là cây có tán lá rộng.
- Hoa mọc thành từng chùm ở đầu ngọn cành gồm có hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.

2. Yêu cầu ngoại cảnh:

- Nhiệt độ thích hợp: 20 — 30°C.
- Lượng m- a hàng năm khoảng 2000 mm/năm
- ánh sáng: Cần ánh sáng cho nên những quả mọc ở ngoài tán có màu đỏ đẹp hơn quả ở trong tán cây.
- Đất: Trồng đ- ợc trên nhiều loại đất, nhưng đất thịt pha cát là thích hợp nhất. Độ pH từ 4,5 — 6,5.

III. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC:

1. Một số giống chôm chôm: -SGK)

Chôm chôm Java, chôm chôm ta, chôm chôm nhãn, chôm chôm Xiêm. . .

2. Nhân giống cây:

Phổ biến là phương pháp gieo hạt, chiết và ghép trong đó ghép là phổ biến hơn cả.

3. Trồng cây:

a. Thời vụ trồng:

- MN: Đầu mùa mưa: Tháng 4 — tháng 5.

b. Khoảng cách trồng:

c. Đào hố bón phân lót:

4. Chăm sóc:

- Làm cỏ, xới xáo: Diệt cỏ dại, mất nơi ẩn náu của sâu bệnh hại, làm đất tơi xốp.
- Bón phân thúc:
 - + Sau khi hái quả và tỉa cành: Phân hữu cơ và phân hoá học.
 - + Đón trước khi hoa nở: Phân đạm và kali.
 - + Nuôi quả: Chất vi l- ợng và chất tăng đậu quả.
- tưới nước
- Tạo hình sửa cành.
- Phòng trừ sâu bệnh.

IV. THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN:

1. Thu hoạch:

- Do quả chín rải rác nên thu hoạch nhiều lần.
- Khi thấy vỏ quả có màu vàng hoặc đỏ vàng thì tiến hành thu hoạch.

2. Bảo quản:

Đựng trong túi ni long ở nhiệt độ 10°C có thể giữ đ- ợc 10 đến 12 ngày mà chất lượng quả không thay đổi

Tuần 24

Bài 12

**NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI SÂU,
BỆNH HẠI CÂY ĂN QUẢ (T1)**

NỘI DUNG

I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU:

- Kính lúp cầm tay có độ phóng đại 20 lần.
- Khay đựng mẫu sâu và bộ phận cây bị sâu hại.
- Mẫu sâu hại và bộ phận cây bị sâu hại. Panh kẹp. Th- ớc dây.

II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH:

B₁ : Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu.

B₂ : Ghi các nhận xét sau khi quan sát.

III. TIẾN HÀNH:

B- ớc 1 : Quan sát và ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu hại :

1. Bộ xít hại nhãn, vải :

- Con tr- ởng thành có màu nâu, đẻ trứng thành ổ d- ới mặt lá, con tr- ởng thành và con sâu non hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa

2. Sâu đục quả nhãn, vải, xoài, chôm chôm :

- Con tr- ởng thành nhỏ có hai râu dài, cánh nhỏ, lông mép cánh d- ới dài, ở cánh trên chỉ có lông ở đầu cánh.

3. Dơi hại vải nhãn :

Còn có tên là con Rốc giống con dơi nh- ng to hơn gấp 3 — 4 lần. Ban ngày ẩn nấp ban đêm ra ăn quả. Dơi th- ờng tập chung thành từng đàn nên mức độ phá hại t- ơng đối lớn.

4. Rầy xanh -Rầy nháy) hại xoài :

- Rầy nhỏ hình nêm dài 3 — 5mm. Có màu xanh đến xanh nâu, đen
- Đẻ trứng ở cuống chùm hoa và bên trong gân lá, mô lá non.

5. Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi :

- Con tr- ởng thành -b- ớm) nhỏ màu vàng nhạt có ánh bạc.

6. Sâu xanh hại cây ăn quả có múi :

- Sâu tr- ởng thành thân to, cánh rộng màu đen. Trên cánh có 6 vệt đỏ vàng.
- Sâu non màu nâu sẫm rồi chuyển dần màu xanh.

7. Sâu đục thân, đục cành hại cây ăn quả có múi :

- Con tr- ởng thành là loại xén tóc màu nâu, sâu non màu trắng ngà, đục phá thân cây và cành lớn. Con cái đẻ trứng vào nách lá và ngọn cành.