

TRƯỜNG THCS THANH ĐÀ

NỘI DUNG HỌC TẬP

MÔN: SINH HỌC KHỐI: 7

BÀI 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

HOẠT ĐỘNG	NỘI DUNG
Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.	HS đọc lại nội dung trong SGK Sinh học 7 bản giấy hoặc SGK điện tử Sinh học 7. https://olm.vn/bg/sinh-hoc-lop-7/ - Đọc phần I. Trùng biến hình trang 20/SGK, sau đó quan sát hình 5.2 trang 20/SGK trả lời câu hỏi phần Δ. - Đọc phần II. Trùng giày về cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản trang 21, 22/SGK.
Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.	Bài tập: HS trả lời câu hỏi bên dưới vào vở (trang 22/SGK) Câu 1: Trùng biến hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào? Câu 2: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào? Câu 3: Không thực hiện.
Hoạt động 3: Học sinh cần nhớ các kiến thức	* Trùng biến hình là động vật đơn bào có cấu tạo rất đơn giản, di chuyển và bắt mồi bằng chân giả, dinh dưỡng nhờ không bào tiêu hóa. * Trùng giày là động vật đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ phận như: nhân lớn, nhân nhỏ, không bào co bóp, miệng, hậu. Mỗi bộ phận đảm nhiệm chức năng sống nhất định. * Trùng biến hình, trùng giày đều sinh sản vô tính theo cách phân đôi, trùng giày còn có hình thức sinh sản tiếp hợp.

TRƯỜNG THCS THANH ĐÀ

NỘI DUNG HỌC TẬP

MÔN: SINH HỌC KHỐI: 7

BÀI 6: TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT

HOẠT ĐỘNG	NỘI DUNG
Hoạt động 1: <i>Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.</i>	HS đọc lại nội dung trong SGK Sinh học 7 bản giấy hoặc SGK điện tử Sinh học 7. https://olm.vn/bg/sinh-hoc-lop-7/ - Đọc phần I. Trùng kiết lị trang 23/SGK. - Đọc phần II. Trùng sốt rét về cấu tạo và dinh dưỡng, vòng đời trang 24, 25/SGK. - Đọc thêm phần “Em có biết” trang 25/ SGK.
Hoạt động 2: <i>Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.</i>	Bài tập: HS trả lời câu hỏi bên dưới vào vở <u>Câu 1:</u> Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị giống nhau và khác nhau như thế nào? <u>Câu 2:</u> Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khỏe con người? <u>Câu 3:</u> Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?
Hoạt động 3: Học sinh cần nhớ các kiến thức	Trùng kiết lị và trùng sốt rét thích nghi rất cao với lối sống kí sinh. Trùng kiết lị kí sinh ở thành ruột. Trùng sốt rét kí sinh ở trong máu người và thành ruột, tuyến nước bọt của muỗi Anophen. Cả hai đều hủy hoại hồng cầu gây bệnh nguy hiểm. Trùng sốt rét lan truyền qua muỗi Anôphen, nên phòng chống bệnh sốt rét khó khăn và lâu dài, nhất là ở miền núi.